



MINIMED INFUZIJSKE SETOVE I SPREMNIKE ZA INZULIN MIJENJAJTE SVAKA 2-3 DANA PREPORUKA ZA BOLJU KONTROLU GLIKEMIJE

Poboljšajte kontrolu glikemije i smanjite moguće komplikacije koje nastaju zbog produženog korištenja infuzijskih setova i spremnika




9 sati nakon isteka roka za primjenu infuzijskog seta dolazi do rizika od nastanka hiperglikemije

Produženo nošenje infuzijskih setova smanjuje učinkovitost u održavanju stabilnih vrijednosti glukoze, unatoč povećanju količine inzulina



4x veći rizik za nastanak komplikacija ubodnog mjesta

- iritacija
- podljevi
- svrbež
- otekline
- bol



50% veći rizik za nastanak oštećenja proizvoda

- savijena kanila
- ispala kanila
- flaster se odljepljuje ili je skroz otpao
- curenje inzulina

**MIJENJAMO SKRB O DIJABETESU ZAJEDNO
ZA MANJE BRIGE I BOLJE ZDRAVLJE**

1. Thethi TK, et al. Consequence of delayed pump infusion line change in patients with type 1 diabetes mellitus treated with continuous subcutaneous insulin infusion. J Diabetes Complication 2010;24(2):73-78.
2. Pfützner A, et al. Using Insulin Infusion Sets in CSII for Longer Than the Recommended Usage Time Leads to a High Risk for Adverse Events: Results From a Prospective Randomized Crossover Study. Sci and Technol. 2015; 9(6):1292-1298.